Estudio PREDyCES
Prevalencia de la desnutrición hospitalaria y costes asociados en España

Sub-análisis en pacientes diabéticos

Prevalencia y costes de la desnutrición hospitalaria en pacientes con DIABETES

La **diabetes mellitus** y la **desnutrición** son situaciones clínicas frecuentes en pacientes hospitalizados, normalmente relacionadas con ingestas inadecuadas, alteraciones metabólicas y trastornos en la absorción de nutrientes.

La presencia de diabetes se asocia a un **riesgo 40% superior** de presentar desnutrición hospitalaria (OR=1.40 (1.03-1.92)

40%

FACTORES asociados a un incremento en la prevalencia de desnutrición

En pacientes diabéticos hospitalizados, los **mayores de 70 años**, las **mujeres** y los que **ingresan de forma urgente**, presentan una prevalencia más alta de desnutrición.

30,1% **1 de cada 3** pacientes diabéticos hospitalizados se encuentra desnutrido o en riesgo de desnutrición (NRS ≥3)

41,6% En ancianos diabéticos el porcentaje de desnutridos o en riesgo de de desnutrición es mayor (NRS ≥3)

ESTANCIA HOSPITALARIA Y ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON DIABETES



COSTES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA EN PACIENTES CON DIABETES



SOPORTE NUTRICIONAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON DIABETES

La desnutrición es una condición prevalente en pacientes diabéticos hospitalizados, especialmente en ancianos.

La **desnutrición**, en estos pacientes se asocia a un **aumento de la estancia hospitalaria y de los costes asociados**.

Solo 1 de cada 4 pacientes diabéticos en riesgo nutricional o desnutridos recibe soporte nutricional

Es necesario instaurar un cribado nutricional sistemático que permita implementar medidas correctivas para evitar las consecuencias relacionadas con la desnutrición.

1. J. Álvarez-Hernández, M. Planas Vila, M. León-Sanz, A. García de Lorenzo, S. Celaya-Pérez, et al. Prevalence and costs of malnutrition in hospitalized patients: the PREDyCES® Study. Nutr Hosp. 2012;27(4):1049-1059. 2. León-Sanz M, Álvarez Hernández J, Planas M, García de Lorenzo A, Araujo K and Celaya-Pérez S on behalf of the PREDyCES® researchers. Prevalence of Hospital Malnutrition in Patients with Diabetes Mellitus: A Sub-Analysis of the PREDyCES® Study. SM J Public Health Epidemiol. 2015;1(4):1018

NestléHealthScience
Where Nutrition Becomes Therapy

Nutrición y control glucémico

para pacientes diabéticos o hiperglucémicos

FINANCIABLES POR EL SNS SEGÚN REAL DECRETO (*)

Concentración calórica	ml	kcal	proteínas			
1,06 kcal/ml	500	530	24 g			
Distribución calórica P/CHO/G/F:18/43/35/4		57 g CHO	20,4 g grasas	10 g fibra		

Neutro CI: 504434
Vainilla CI: 250159
Frutas CI: 395475

Dieta completa y equilibrada con fibra

NovaSource Diabet

Concentración calórica	ml	kcal	proteínas			
1,23 kcal/ml	500	613	30 g			
Distribución calórica P/CHO/G/F:20/39/39/2		60 g CHO	26,5 g grasas	7,5 g fibra		

Neutro CI: 504645
Vainilla CI: 244905

Dieta completa hiperproteica e hipercalórica con fibra

NovaSource Diabet Plus

Concentración calórica	ml	kcal	proteínas			
1 kcal/ml	200	200	14 g			
Distribución calórica P/CHO/G/F:28/43/25/4		21,6 g CHO	5,6 g grasas	4 g fibra		

Vainilla CI: 504504
Fresa CI: 504505
Café CI: 501213
Multisabor CI: 504768

Dieta completa hiperproteica con fibra

RESOURCE DIABET

Concentración calórica	ml	kcal	proteínas			
1,6 kcal/ml	200	320	18 g			
Distribución calórica P/CHO/G/F:23/39/35/3		31,4 g CHO	12,6 g grasas	5 g fibra		

Vainilla CI: 504773
Fresa CI: 504774
Multisabor CI: 504775

Dieta completa hiperproteica e hipercalórica con fibra

RESOURCE DIABET PLUS

24017430

(*) RD 1205/2010 en las indicaciones que marca el RD 1030/2006

Nexo
Programa de nutrición enteral a domicilio 24h./365 días
Regístrese en **www.nexonutricion.com**

NestléHealthScience
Where Nutrition Becomes Therapy