Enteral NETWORK



PROTOCOLOS DE NUTRICIÓN ENTERAL POR SONDA

Comité científico

Dr. Alejandro Sanz Paris[1]

Dr. Juan Manuel Guardia Baena[2]

1. Servicio de Endocrinología Y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Sevet (Zaragoza). 2. Awevicio de Endocrinología. Nutrición y Diabetes. Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada)

Conecta con la nutrición enteral en positivo

Dietas de Nutrición Enteral

Nestlé HealthScience

ISOSOURCE® 2.0 PROTEIN

Nutrición enteral por sonda en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 4

ISOSOURCE® PROTEIN FIBRA

Nutrición enteral por sonda en pacientes con alto grado de estrés metabólico 8

ISOSOURCE® ENERGY FIBRA

Nutrición enteral por sonda en paciente anciano con restricción hídrica y disfagia 12

NOVASOURCE® GI CONTROL

Nutrición enteral por sonda en el paciente con cirugía de colon 16

ANEXO

6

ISOSOURCE® 2.0 PROTEIN FIBRA

Nutrición enteral por sonda para pacientes con altos requerimientos

10

NOVASOURCE® DIABET PLUS

Nutrición enteral por sonda en paciente concon diabetes *mellitus* o hiperglucemia de estrés que, tras sufrir un ictus, presente disfagia

14

NOVASOURCE® GI PROTEIN

Nutrición enteral por sonda en paciente con diarrea asociada a nutrición enteral (DANE)

18

PEPTAMEN® ENTERAL
PEPTAMEN® AF ENTERAL

Nutrición enteral por sonda en paciente tras cirugía abdominal

Síndrome de intestino corto y patología neoplásica pancreática



Nutrición enteral por sonda en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

ISOSOURCE® 2.0 PROTEIN

Autores

Natalia Covadonga Iglesias Hernández (coordinadora)
Servicio de Endocrinología y Nutrición. H. Universitario de Basurto (Donostia)

Eider Etxebarría Martín
Servicio de Endocrinología y Nutrición. H. Universitario de Basurto (Donostia)

Laura Calles Romero
Servicio de Endocrinología y Nutrición. H. Universitario de Basurto (Donostia)

Andoni Monzón Mendiolea
Servicio de Endocrinología y Nutrición. H. Universitario de Basurto (Donostia)

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a **las motoneuronas corticales**, **bulbares** y **medulares**

PROTOCOLO

índice



Nutrición enteral por sonda para pacientes con altos requerimientos

ISOSOURCE® 2.0 PROTEIN FIBRA

Autores

Margarita González Boillos (coordinadora)

FEA de Endocrinología y Nutrición de la Sección de Endocrinología y Nutrición del HGUCS.
H. General de Castellón

María Chiva Martínez

Dietista-Nutricionista de la Sección de Endocrinología y Nutrición del HGUCS.
H. General de Castellón

Iciar Castro de la Vega

Dietista-Nutricionista de la Sección de Endocrinología y Nutrición del HGUCS.
H. General de Castellón

La **nutrición enteral hipercalórica** puede resultar interesante para un amplio rango de pacientes.

PROTOCOLO

índice



Nutrición enteral por sonda en pacientes con alto grado de estrés metabólico

ISOSOURCE® PROTEIN FIBRA

Autores

Irene Gonzalo Montesinos (coordinadora)
Servicio de Endocrinología. Hospital de Fuenlabrada. Madrid

Emilia Cancer Minchot
Servicio de Endocrinología. Hospital de Fuenlabrada. Madrid

Soralla Civantos Modino
Servicio de Endocrinología. Hospital de Fuenlabrada. Madrid

Alicia Moreno Borreguero
Servicio de Endocrinología. Hospital de Fuenlabrada. Madrid

La **nutrición hiperproteica** está especialmente indicada en **pacientes con alto grado de estrés metabólico** que presentan aumento de los requerimientos proteicos.

PROTOCOLO

índice



Nutrición enteral por sonda en paciente con diabetes *mellitus* o hiperglucemia de estrés que, tras sufrir un ictus, presente disfagia

NOVASOURCE® DIABET PLUS

Autores

María de Damas Medina (coordinadora)
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Jaén

Macarena Moreno Martínez
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Jaén

Juan de Dios Barranco Ochoa
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Jaén

El **accidente cerebrovascular (ACV)** o **ictus** puede cursar con disfagia, pérdida de seguridad y eficacia para la deglución o alteración del nivel de conciencia que imposibilite la ingesta oral.

PROTOCOLO

índice



Nutrición enteral por sonda en paciente anciano con restricción hídrica y disfagia

ISOSOURCE® ENERGY FIBRA

Autores

Carmen Ripa Ciaurriz (coordinadora)
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Donostia

Larraitz Leunda Eizmendi
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Donostia

David García Echeverria
Servicio de Farmacia. Hospital de Mendaro



En la población anciana ocurren diversos cambios fisiológicos, patológicos, psicológicos y sociales **que influyen en su estado nutricional**

PROTOCOLO

índice



Nutrición enteral por sonda en paciente con diarrea asociada a nutrición enteral (DANE)

NOVASOURCE® GI PROTEIN

Autores

Miguel Damas Fuentes (coordinador)
Unidad de Nutrición. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

José Manuel García Almeida
Unidad de Nutrición. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga

La **diarrea** es una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la utilización de nutrición enteral

PROTOCOLO

índice



Nutrición enteral por sonda en el paciente con cirugía de colon

NOVASOURCE® GI CONTROL

Autores

Juana María Rabat Restrepo (coordinadora)
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Beatriz González Aguilera
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Cristina Campos Martín
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

María Dolores García Torres
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Los **pacientes intervenidos con cáncer de colon** o **postoperados** y **críticamente enfermos** son más propensos a padecer diarreas inducidas por nutrición enteral

PROTOCOLO

índice



Nutrición enteral por sonda en paciente tras cirugía abdominal

Síndrome de intestino corto y patología neoplásica pancreática

PEPTAMEN® ENTERAL
PEPTAMEN® AF ENTERAL

Autores

Concha Vidal Peracho (coordinadora)
Endocrinología y Nutrición. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Cristina León Cinto
Medicina Intensiva. Hospital Royo Villanova. Zaragoza

En el **paciente quirúrgico**, el soporte nutricional durante el periodo perioperatorio está indicado tanto en los pacientes desnutridos como en los que se encuentran en riesgo de desnutrición, dado que la cirugía mayor puede interferir en la normalización de la función gastrointestinal al provocar un aumento del gasto proteico y energético.

PROTOCOLO

índice

Conecta con la nutrición enteral en positivo

Dietas de Nutrición Enteral

Nestlé HealthScience